

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПОРОСОВ

В.С. Фащук, И.Н. Казаровец
УО «БГАТУ», г. Минск, Республика Беларусь

Свиноводство – одна из наиболее эффективных отраслей животноводства республики Беларусь. Характерные особенности свиней: многоплодие 10 – 14 поросят; короткий период супоросности 112-116 дней, при правильной организации производства и раннем отъеме поросят (26-35 дней) от каждой матки в год получают 2,2-2,3 опороса; скороспелость, живой массы 100 кг достигают за 180-190 дней, к воспроизводству свинки готовы в 8-9 мес., а в 12 мес. могут принести первый приплод; сравнительно малые затраты корма на единицу прироста 4-5 к.ед, а так же высокий убойный выход 70-80% [1].

Опорос является одним из важнейших моментов процесса воспроизводства свиней. Успешное его проведение зависит от качества и своевременности подготовки помещений и самих животных. Станок для опороса должен отвечать соответствующим требованиям: разделен на зону содержания маток, отдыха и кормления поросят, для локального обогрева поросят устраивать электрообогревающие полы и инфракрасные лампы. Супоросных свиноматок за 3-7 дней перед переводом в помещение для опороса моют и дезинфицируют. За неделю до опороса тяжелосупоросных переводят в родовое отделение и размещают в индивидуальные станки. За 3-4 дня до опороса постепенно сокращают кормовую дачу до 50 % от нормы, из рациона сокращают молокогонные корма, чтобы предотвратить появление мастита. В день опороса кормление можно довести до минимума, предоставить воду или болтушку. Перед опоросом пол покрывают слоем опилок и включают лампу. Продолжительность опороса 3-5 часов, обязательно присутствие оператора, интервал между рождением поросят 15-20 минут. Каждого поросенка вытирают, пуповину дезинфицируют. Организовать их кормление необходимо в течении 30-40 минут после опороса. За лактацию матка продуцирует 1 кг молока, а среднесуточная молочность 7-8 кг [2].

Основные потери поросят в подсосный период приходятся на первые 3 дня, среди главных причин: голодание, задавливание, врожденные аномалии, низкая живая масса, укусы. Гнезда поросят под маткой следует комплектовать по их массе и по числу доступных сосков для сосания. Лишних и слабых поросят отсаживают.

Литература

1. Шейко, Р.И. Интенсификация производства свинины на промышленной основе : монография / Р.И. Шейко. – Мн.: УП «Технопринт», 2004. – 120 с.
2. Федоренкова, Л.А. Свиноводство племенное и промышленное : практическое пособие / Л. А. Федоренкова, В. А. Дойлидов, В. П. Ятусевич. – Витебск : ВГАВМ, 2014. – 218 с.